نانوواحد صنعت پرشیا

بایو GME

انگور

نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسیل C5 به‌صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.
- مقدار توصیه شده برای یک درخت است.

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای باغات انگور

سن درخت	بایوجمی (پودر یا گرانول)	بایوجمی مایع	استینا 400 اسیل C5	سیسانول K800
نهال	در زمان کاشت، یک کیلوگرم، ۲۰ سانتی‌متر زیر محل ریشه چالکود شود	۱۰ سی‌سی استینا و ۱۰ سی‌سی اسیل همراه با آبیاری آب		
۴-۲ سال	۲ کیلوگرم از بهمن تا اواخر اسفند در فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی متری از تنه درخت در عمق ۲۰ سانتی متری چالکود شود	۲۰ سی‌سی استینا و ۲۰ سی‌سی اسیل با آبیاری اول در اوایل بهار	۲۰ سی‌سی در دومین آبیاری	محلول پاشی ۲ در هزار در خردادماه
۴سال به بالا	۲/۵ تا ۳ کیلوگرم از بهمن تا اواخر اسفند در فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری از تنه درخت در عمق ۲۰ سانتی‌متری چالکود شود.	۲۰ سی‌سی استینا و ۲۰ سی‌سی اسیل با آبیاری اول در اوایل بهار	۲۰ سی‌سی در دومین آبیاری	محلول پاشی ۲ در هزار در خردادماه