



مرحله ضد عفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400 این محلول بر روی بذرها اسپری شود.

نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بیوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توأم استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بیوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بیوجمی برای مزارع ذرت، آفتابگردان، سورگوم

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بیوجمی (گرانول)	۱ تا ۱/۵ تن در هکتار	قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
استینا 400	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	همزمان با اولین آبیاری	با آب آبیاری
اسیل C5	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	همزمان با اولین آبیاری	با آب آبیاری
بیوجمی (کود مایع)	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله اول : شروع رشد رویشی (۴ تا ۶ برگ)	با آب آبیاری
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله دوم : تشکیل گل آذین نر	
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله سوم : پرشدن دانه ها	