



مرحله ضد عفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- این محلول بر روی بذرها اسپری شود.

نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع سبزیجات

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (گرانول)	۲ تا ۳ تن در هکتار	قبل از کاشت	در سطح زمین زراعی پاشیده شود
استینا 400	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
اسپیل C5	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
بایوجمی (مایع)	۲۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار	پس از هر چین	همراه با آب آبیاری
سیسانول K800	۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	یک هفته قبل از برداشت	محلول پاشی