



مرحله ضد عفونی غده و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- این محلول به روی غده ها اسپری شود.

نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع سیب زمینی

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (گرانول)	۲ تا ۳ تن در هکتار	قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
استینا 400	۱۰ لیتر در هکتار	آبیاری اول	همراه آب آبیاری
اسپیل C5	۱۰ لیتر در هکتار	آبیاری اول	همراه آب آبیاری
بایوجمی (کود مایع)	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله اول: شروع رشد رویشی	همراه با آب آبیاری
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله دوم: شروع گلدهی	
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله سوم: پر شدن غده	
سیسانول K800	۲ تا ۲/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	شروع مرحله گلدهی	محلول پاشی