



مرحله ضد عفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- این محلول بر روی بذرها اسپری شود.

نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع صیفی جات

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (گرانول)	۲ تا ۳ تن در هکتار	قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
استینا 400	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
اسیل C5	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
بایوجمی (مایع)	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله اول : شروع رشد رویشی (۴ تا ۶ برگه)	همراه با آب آبیاری
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله دوم : تشکیل میوه	
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله سوم : شروع گلدهی دوم	
سیسانول K800	۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	تشکیل میوه	محلول پاشی