



### مرحله ضد عفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- قلمه ها با محلول شستشو داده شوند.

### نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

### دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع نیشر (plant)

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (گرانول)	۲ تا ۲/۵ تن در هکتار	قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
استینا 400	۲۰ لیتر در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
اسپیل C5	۲۰ لیتر در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
بایوجمی (کودمایع)	۴۰ لیتر در هکتار	با آبیاری سوم و چهارم	همراه با آب آبیاری

### دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع نیشر (راتون)

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (پودر)	۵۰۰ کیلو در هکتار	قبل از کاشت	با آب آبیاری در سطح مزرعه پخش شود
استینا 400	۲۰ لیتر در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
اسپیل C5	۲۰ لیتر در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
بایوجمی (کودمایع)	۴۰ لیتر در هکتار	با آبیاری سوم و چهارم	همراه با آب آبیاری