



### مرحله ضد عفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- این محلول بر روی بذرها اسپری شود.

### نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

### دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع پیاز و سیر

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (گرانول)	۱ تا ۲ تن در هکتار	قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
استینا 400	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	همراه با اولین آبیاری	همراه با آب آبیاری
اسپیل C5	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	همراه با اولین آبیاری	همراه با آب آبیاری
بایوجمی (مایع)	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله اول : رشد رویشی (۴ تا ۶ برگ)	همراه با آب آبیاری
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله دوم : اواسط تشکیل غده	
سیسانول K800	۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	شروع تشکیل پیاز	محلول پاشی