



نکته مهم جهت استفاده از محصول

- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بیوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بیوجمی برای مزارع چغندر قند

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بیوجمی (گرانول)	۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ ماه قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
کود اوره	۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ ماه قبل از کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
بیوجمی (گرانول)	۶۵۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم در هکتار	در زمان کاشت	با خاک مزرعه مخلوط شود
استینا 400 و اسپیل C5	۲۰ لیتر از هرکدام در هکتار	با آبیاری اول	همراه با آب آبیاری
	۱۰ لیتر از هرکدام در هکتار	۳۰ روز بعد از کاشت	
	۱۰ لیتر از هرکدام در هکتار	۶۰ روز بعد از کاشت	
بیوجمی (مایع)	۴۰ لیتر در هکتار	۹۰ روز بعد از کاشت	همراه با آب آبیاری
سیسانول K800	۲ تا ۲/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	در مرحله ۶ تا ۸ برگی	محلول پاشی