



### مرحله ضد عفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- این محلول بر روی بذرها اسپری شود.

### نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بیوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بیوجمی مایع خودداری شود.

### دستور مصرف بیوجمی برای مزارع کنجد و کلزا

| نحوه استفاده           | زمان استفاده                 | میزان مصرف                           | نام محصول              |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| با خاک مزرعه مخلوط شود | قبل از کاشت                  | ۱ تا ۲ تن در هکتار                   | بیوجمی (گرانول)        |
| همراه با آب آبیاری     | همراه با اولین آبیاری        | ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار<br>از هر کدام | استینا 400<br>اسپیل C5 |
| همراه با آب آبیاری     | مرحله اول:<br>شروع رشد رویشی | ۲۰ لیتر در هکتار                     | بیوجمی (مایع)          |
|                        | مرحله دوم: پرشدن دانه ها     | ۲۰ لیتر در هکتار                     |                        |