



نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بیوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بیوجمی مایع خودداری شود.
- مقدار توصیه شده برای یک درخت است.

دستور مصرف محصولات بیوجمی برای مزارع گل محمدی

سن بوته	بیوجمی (پودر یا گرانول)	بیوجمی مایع	استینا 400 اسپیل C5
نشاء	۵۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر نشاء، با خاک محل کاشت مخلوط شود		۱۰ سی سی استینا به همراه ۱۰ سی سی اسپیل همراه با آبیاری اول برای هر بوته
۱-۲ سال	۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم برای هر بوته از بهمن تا اواخر اسفند در فاصله ۲۰ سانتی متری بوته در عمق ۱۰ سانتی متری چالکود شود	۳۰ سی سی برای هر بوته در اواخر فروردین	۱۰ سی سی استینا به همراه ۱۰ سی سی اسپیل همراه با آبیاری اول برای هر بوته
۳-۴ سال	۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم برای هر بوته از بهمن تا اواخر اسفند در فاصله ۱۵ سانتی متری بوته در عمق ۱۰ سانتی متری چالکود شود	۳۰ سی سی برای هر بوته در اواخر فروردین	۱۵ سی سی استینا به همراه ۱۵ سی سی اسپیل همراه با آبیاری اول برای هر بوته
۴ سال به بالا	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم برای هر بوته از بهمن تا اواخر اسفند در فاصله ۲۰ سانتی متری بوته در عمق ۱۰ سانتی متری چالکود شود	۳۰ سی سی برای هر بوته در اواخر فروردین	۱۵ سی سی استینا به همراه ۱۵ سی سی اسپیل همراه با آبیاری اول برای هر بوته