



مرحله ضدعفونی و افزایش جوانه زنی

- تهیه محلول حاوی ۵٪ حجمی اسپیل C5 و ۵٪ حجمی استینا 400
- این محلول بر روی بذرها اسپری شود.

نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استینا 400 و اسپیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.

دستور مصرف محصولات بایوجمی برای مزارع گندم، جو، تریپتیکاله و چاودار

نام محصول	میزان مصرف	زمان استفاده	نحوه استفاده
بایوجمی (گرانول)	یک تن در هکتار	قبل از کاشت	با خاک مزرعه به صورت سطحی مخلوط شود.
استینا 400	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	همراه با آب آبیاری	همراه با آب آبیاری
اسپیل C5	۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار		
بایوجمی (کود مایع)	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله اول : در شروع پنجه زنی	همراه با آب آبیاری
	۲۰ لیتر در هکتار	مرحله دوم : در شروع پر شدن خوشه ها	
سیسانول K800	۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	هنگام تشکیل خوشه	محلول پاشی