

زنگنه  
بايو شلیل



### نکات مهم جهت استفاده از محصول

- در صورت استفاده از روش کشت بایوجمی، از کودهای دامی فرآوری شده استفاده شود.
- محلول استیننا 400 و اسیل C5 به صورت توام استفاده شوند و از مخلوط کردن محلول با بایوجمی مایع خودداری شود.
- مقدار توصیه شده برای یک درخت است.

### دستور مصرف محصولات بایوجمی برای باغات میوه (زردآلو، هلو، شلیل)

سن درخت	بایوجمی (پودر یا گرانول)	بایوجمی مایع	استیننا 400 اسیل C5	سیسانول K800
نهال	در زمان کاشت، یک کیلوگرم، ۲۰ سانتی‌متر زیر محل ریشه چالکود شود	۵ سی سی اواسط خرداد	۵ سی سی استیننا به همراه ۵ سی سی اسیل پس از کاشت همراه با آب آبیاری	
۲-۴ سال	در اسفند، ۲ تا ۳ کیلوگرم در فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متری از تنہ درخت در عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متری چالکود شود	۱۰ سی سی در اردیبهشت ۱۰ سی سی در خرداد	۱۰ سی سی استیننا به همراه ۱۰ سی سی اسیل در اواخر اسفند پس از رشد مجدد همراه با آب آبیاری	۲ در هزار در مرحله گردوبی شدن میوه
۵-۶ سال	در اسفند، ۲ تا ۳ کیلوگرم در فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متری از تنہ درخت در عمق ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متری چالکود شود	۲۵ سی سی در مرحله گلدهی ۲۰ سی سی در مرحله فندقی شدن میوه	۱۵ سی سی استیننا به همراه ۱۵ سی سی اسیل در اواخر اسفند پس از رشد مجدد همراه با آب آبیاری	۲/۵ در هزار در مرحله گردوبی شدن میوه
به بالا	در اسفند، ۴ کیلوگرم در فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متری از تنہ درخت در عمق ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متری چالکود شود	۲۵ سی سی در مرحله گلدهی ۲۵ سی سی در مرحله فندقی شدن میوه	۱۵ سی سی استیننا به همراه ۱۵ سی سی اسیل در اواخر اسفند پس از رشد مجدد همراه با آب آبیاری	۲/۵ در هزار در مرحله گردوبی شدن میوه